

# Vespa-das-galhas-do-castanheiro

*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu

A vespa-das-galhas-do-castanheiro, *Dryocosmus kuriphilus* é um inseto que se desenvolve nos gomos do castanheiro e provoca a formação de galhas nos ramos e folhas.

**Esta praga causa grandes quebras de produção e perda de qualidade do fruto.**



Galhas formadas no pecíolo e nervura das folhas



Coloração rosada das galhas



Interior da galha



Galhas do ano anterior, ainda penduradas na árvore



## Medidas de controlo

- O tratamento químico é pouco eficaz e tem grande impacto negativo no ambiente, pelo que se recomenda a luta biológica, utilizando o himenóptero *Torymus sinensis*, parasitóide de larvas do *Dryocosmus kuriphilus*.
- Em soutos jovens observar cuidadosamente as plantas a partir da rebentação. Eliminar os ramos com galhas do ano e queimá-los.
- Não utilizar porta-enxertos nem plantas infetadas.
- Adquirir plantas produzidas em regiões onde ainda não se tenha detetado esta praga.

### Sr. Agricultor:

se detetar a presença deste tipo de ramos, agradecemos que comunique imediatamente à Câmara Municipal (Gabinete Técnico Florestal), dando indicação do local e número de castanheiros atacados.

A sua ajuda é muito importante para o controlo da praga.